

がん種	非小細胞肺がん		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	CDDP+VNR		点滴投与時間	day1 3h50m, day8 30m
1コース期間	21days		休薬期間	day9-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
②	ロゼウス(25mg/m ²) + 生食 50mL	点滴静注	5分 (全開)
③	アスパラギン酸K注 10mEq + 硫酸Mg補正液 8mL + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
④	マンニトールS 300mL	点滴静注	30分
⑤	ランダ(80mg/m ²) + 生食 500mL(全量500mL)	点滴静注	1時間
⑥	アスパラギン酸K注 10mEq + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day4		
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day8		
メイン①	ソルデム3A 200mL	点滴静注	30分
側管①	デキサート 3.3mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
側管②	ロゼウス(25mg/m ²) + 生食 50mL	点滴静注	5分 (全開)
側管③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ