

がん種	胆道がん		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	CDDP+GEM		点滴投与時間	5h
1コース期間	21 days		休薬期間	day9-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1.8		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60～90分前に内服	経口	
メイン①	ソルデム3A 500mL	点滴静注	1時間40分
側管①	デキサート 9.9mg + グラニセトロンバッグ	点滴静注	15分
側管②	ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
メイン②	ソルデム3A 500mL	点滴静注	1時間40分
側管③	ランダ(25mg/m ²) + 生食 250mL(全量250mL)	点滴静注	1時間 (メイン開始2h後)
側管④	マンニトール 300mL	点滴静注	1時間
メイン③	ソルデム3A 500mL	点滴静注	1時間40分
側管⑤	ラシックス 20mg + 生食 50mL	点滴静注	5分 (メイン終了直前)
	day2.3.9.10		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1～2回分服)	経口	
	day4.11		
	デカドロン錠 8mg/day (1～2回分服)	経口	