

がん種	卵巣がん		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	CPT-11+CDDP (short hydration)		点滴投与時間	day1:5h15m day8、15:1h50m
1コース期間	28days		休業期間	day16-28

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60分～90分前に内服	経口	
①	アロキシ点滴バッグ0.75mg/50mL + デキサート9.9mg	点滴静注	15分
②	イリノテカン (60mg/m ²) + 生食500mL	点滴静注	90分
③	ソルデム1 500mL + アスパラギン酸カリウム注 10mEq + 硫酸Mg補正液 8mL	点滴静注	1時間
④	マンニトールS 300mL	点滴静注	30分
⑤	ランダ (60mg/m ²) + 生食 500mL (全量500mL)	点滴静注	1時間
⑥	ソルデム1 500mL + アスパラギン酸カリウム注 10mEq	点滴静注	1時間
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン 8mg/day	経口	
	day4		
	デカドロン 8mg/day	経口	
	day8、15		
①	デキサート9.9mg + グラニセトロンバッグ	点滴静注	15分
②	イリノテカン (60mg/m ²) + 生食500mL	点滴静注	90分
③	生食50mL	点滴静注	ルートフラッシュ