

がん種	乳がん	催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	wCBDCA+wPTX+pembrolizumab	点滴投与時間	day1: 3h day8.15: 2h30m
1コース期間	21 days	休業期間	day15-21
処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	内服	
メイン①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
メイン②	キイトルーダ(200mg/body) + 生食100mL	点滴静注	30分
メイン③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
メイン④	デキサート 4.95mg + ポララミン注5mg + ファモチジン20mg + アロキシ点滴バッグ 0.75mg/50mL	点滴静注	15分
メイン⑤	パクリタキセル(80mg/m ²) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
メイン⑥	カルボプラチン(AUC=1.5) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
メイン⑦	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	day8.15		
メイン①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
メイン②	ファモチジン注 20mg + デキサート 8.25mg + ポララミン 5mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
メイン③	パクリタキセル(80mg/m ²) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
メイン④	カルボプラチン(AUC=1.5) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
メイン⑤	生食 50mL	静注	ルートフラッシュ